

FLORINI®

 **HilverdaKooij**
plant technology
www.hilverdakooij.nl

Teelthandleiding

TEELTHANDLEIDING voor Florini® pot antirrhinum

Algemeen

Florini® pot leeuwenbekken zijn uit stek vermeerderde planten die vele voordelen bieden ten opzichte van soortgelijke planten vermeerderd uit zaad: uniforme en rechtopgaande groei, hoge groeisnelheid, en beschikbaar in vele unieke in het oogspringende kleuren. Florini® is geurend, in verschillende potmaten te telen en bijzonder geschikt voor tuin en terras. Florini® bloeit uitbundig tot ver in het najaar en kan gedurende winter lichte vorst verdragen.

Florabella®

De Florini® Florabella® hangtypen bloeien van vroeg in het voorjaar tot laat in het najaar. Een betere doorbloei wordt verkregen door tijdig de uitgebloeide bloemen te verwijderen. De Florini® Florabella® hangtypen kenmerken zich door hun bolvormige groei.

Potgrond en potmaten:

Potmaat: 12 - 15 cm diameter (1 stek)
15 cm diameter (dubbele stek in de zomer)
meer dan 15 cm: twee of meer stekken.

Een belangrijk criterium voor de kwaliteit van potgrond is de water-/zuurstofverhouding. Potgrond gemengd met 15% perliet geeft een goed resultaat. Ervaringen bij andere teelten leren dat toevoegen van klei ook prima teeltresultaten kan geven. De optimale pH-waarde van de grond ligt tussen 5.5. en 6.5. Het toevoegen van een voorraadbemesting is nodig.

De volgende werkwijze moet worden toegepast bij onbemeste potgrond:

Toevoegingen per m³ (85% medium turf + 15% perliet):

- 4 kg. Dolokal
- 1.50 kg. P.G. mix
- 30 gr. Libro-mix

Raadpleeg eventueel uw potgrondleverancier.

Voeding en berekening:

Voor een goede start wordt eerst kunstmest met calciumnitraat en 10-52-10 (Pokon) aanbevolen. Later kan het beste worden bij bemest met een meststof die ook magnesium bevat zoals bijv. 15-3-15-5. Neem regelmatig monsters van de grond om de voedingscondities te controleren. Beperk de voedingsconcentratie tot maximaal 1.5 E.C. want antirrhinum is gevoelig voor een hoger zoutgehalte.

De Florini® antirrhinum heeft behoorlijk veel water nodig. Krijgt het gewas echter te veel water in het voorjaar dan kan de Florini® antirrhinum makkelijker te hoog worden. Wanneer de grond voor een langere periode te nat wordt gehouden, is de kans op voet/wortelrot groot. Als er wordt berekend, let er dan op

dat het gewas zo snel mogelijk droogt. Het is het beste om 's ochtends water te geven. Boven door water geven tijdens de teelt is geen probleem wanneer het water dat gebruikt wordt weinig zouten bevat. Wees in ieder geval voorzichtig met open bloemen en zorg ervoor dat het gewas snel droogt.

Overige teeltinstructies:

Het gebruik van een gronddoek verdeelt het water beter, beperkt het doorwortelen en uitval door voet/wortelrot.

Normaal gesproken moeten planten getopt worden op 2/3 bladparen (na ongeveer 2 weken) om een goede plantopbouw te krijgen.

Aan het begin van de teelt kunnen de potten tegen elkaar worden geplaatst. Na enkele weken moeten de planten worden uitgezet, op eindafstand kunnen er ongeveer 35- 40 planten per m² (12 cm potgrootte) staan. De kasttemperatuur heeft een specifieke invloed op de groeisnelheid en de compactheid. **Florini**[®] antirrhinum kan het beste koud worden geteeld, de optimale temperatuur ligt tussen de 8 -12° C. Direct na het oppotten kan voor een goede doorworteling een iets hogere temperatuur worden aangehouden. Wanneer de dagtemperatuur lager wordt gehouden dan de nachttemperatuur, zullen de planten compacter groeien.

Toevoeging van CO₂ verbetert de kwaliteit. De gemiddelde teeltduur zal dan ook een week korter zijn. Het optimale CO₂-gehalte is 700- 1000 p.p.m.

Groeiremmer:

De praktijk heeft uitgewezen dat afhankelijk van de groeiomstandigheden het gebruik van een remstof noodzakelijk is. Als er natter wordt geteeld voor het krijgen van zwaardere planten is het gebruik van een remstof zeker nodig. Zowel Alar, Cycocel als Bonsi worden in de praktijk toegepast. Begin met 0.3 – 0.4% Alar , 0.15% Cycocel of 0.1% Bonsi en verhoog de dosis afhankelijk van de resultaten.

Teeltduur:

De teeltduur hangt af van de lichtintensiteit (seizoen) en teeltmaatregelen. Onderstaand schema is van toepassing bij de teelt van het sortiment van HilverdaKooij B.V., afhankelijk van temperatuur kan de teelt langer of korter zijn.

Vereiste tijd tot bloei:

Oppotten in week 48 geeft bloei in week 12.

Oppotten in week 2 geeft bloei in week 16.

Oppotten in week 12, bloei in week 20.

Oppotten in week 30 geeft bloei in week 35.

Ongedierte-/plantenziektebestrijding

Ongedierte:

- Bladluizen

Ziektes:

- Voetrot
- Grauwe schimmel, Botrytis
- Pythium

Tegen voetrot wordt geadviseerd om direct na het oppotten te spuiten met een mengsel van diverse Fungiciden. Eventueel moet deze bespuiting na enkele weken nog een keer herhaald worden.

Regelmatige bestrijding tegen Botrytis is ook aan te raden. Een goed resultaat geeft een regelmatige bespuiting met Sumico of Rovral.

Steeketiketten:

Alle stekken zullen worden geleverd met een steeketiket.

Wij hopen dat deze korte teelthandleiding een bijdrage zal leveren tot een succesvolle teelt van **Florini**[®] pot-antirrhinum. Voor overige informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Contactpersonen:

Jeroen de Kuijer

Product/ Sales Manager

Office direct: +31 (0) 297 38 20 61

Mobile: +31 (0) 653 17 23 87

E-mail: jeroen.dekuijer@hilverdakooij.nl

Addie de Joode

Area Manager

Office direct : +31 (0) 297 38 20 58

Mobile : +31 (0) 651 32 75 01

E-mail : addie.dejoode@hilverdakooij.nl

Bart Sneek

Area Manager

Office direct : +31 (0) 297 38 20 56

Mobile : +31(0) 620 61 56 98

E-mail : bart.sneek@hilverdakooij.nl

Co Overduin

Area Manager

Office : +31 (0) 297 38 20 57

Mobile : +31 (0) 653 96 3381

E-mail : co.overduin@hilverdakooij.nl